

Orientações após o exame de colonoscopia

Após 30 minutos

Após 30 minutos pode-se iniciar uma dieta leve e ir incrementando a alimentação aos poucos até que a noite a dieta normal esteja restabelecida.

Até 4 horas

As medicações usadas podem produzir uma sedação que dura em média 4 horas. Neste período o paciente deve privar-se de executar atividades exijam reflexos rápidos como dirigir e operar máquinas perigosas.

Durante o exame há necessidade de insuflar o cólon (intestino) com ar. O mesmo provoca uma sensação de estofamento e cólicas que melhoram com a deambulação (caminhar) ou tomar um banho quente, que provocam a eliminação do ar residual

Nas próximas 24 horas

Alguns episódios de diarréia podem ainda ocorrer por ação residual dos laxantes sendo que esta não costuma incomodar mais no dia seguinte.

Até 72 horas

Em caso de dor forte ou sangramento importante, contacte com o medico que realizou o exame pelos números

ENDOCLÍNICA: 3521-9000 PROCTOCLINIC 3521-2141 CELULAR: 9914-8677 CASA: 3521-1941

O exame deve ser apresentado ao médico que o solicitou no menor tempo possível.

No caso da coleta de material para biópsias, o mesmo deve ser enviado ao laboratório em até 48 horas e demora em torno de 15 dias para ficar pronto

Dr. Abel Botelho Quaresma Coloproctologia CRM 6645

ENDOCLÍNICA – Centro integrado de endoscopia Av. Santa Terezinha 275 – Anexo ao Hospital São Miguel Joaçaba – SC – CEP 89.600.000 – Fone/fax: (49) 3521-9000